

Историко-археологические исследования
в Азове и на Нижнем Дону в 1998 г.
Азов, 2000. Вып. 16.

В.В. Титов

Грызуны многослойной археологической стоянки Раздорское-1.

Автором впервые проведены систематические сборы остатков мелких позвоночных из ряда слоев разреза археологического поселения Раздорское-1 (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст. Раздорская). Стоянка в течении многих лет изучалась экспедицией Ростовского Госуниверситета под руководством В. Я. Кияшко. Здесь в разрезе высокой поймы правого берега р. Дон выявлено 14 культурных слоев охватывающих период от раннего энеолита до позднего средневековья (Кияшко, 1994).

Были найдены остатки рыб, амфибий, рептилий, грызунов.

Сводная таблица результатов исследования археологической стоянки Раздорское-1							
Геохронология, периоды	Археологическая периодизация	культуры	слои	абсолютная хронология	грызуны	палеонтология, климат (по К.Кременскому)	
ДОНЕЦКИЙ	средневековые	салтово-маяцкая	14	1100-1000 л.л.	Microtus ex gr. arvalis, Arvicola terrestris, Mus musculus, Sicista sp., Cricetus cricetus, Spalax microphthalmus	Спектр пыльцы и климат близок к современному	
		поздний	ранний	13	2400-2200 л.л.		
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ	поздний	белозерская	12	3100-2900 л.л.	Muridae gen. (мелкая форма), Spalax microphthalmus	Увеличение площади лесов, мезофитный травяной покров, увлажненный климат	
		срубная	11	3400-3200 л.л.			
		средний	катакомбная	10	3700-3400 л.л.	Microtus ex gr. arvalis, Lagurus sp.	Увеличение площадей боров и пойменных лесов, увеличение кол-ва пыльцы маревых, уменьшение сложноцветных, распространение ксерофитных злаков, степей, начало земледелия; климат аридный, засоление пойменных почв
			поздневая (фетинская)	9	4200-4000 л.л.	Microtus ex gr. arvalis, Muridae gen. (мелкая форма)	
СУБОРСКИЙ	ранний	константиновская	7	4500-4200 л.л.	Castor fiber	Сосновые бора+береза, дубово-грабово пойменные леса, злаково-разнотравная растительность; климат влажный	
							майковская
		развитой	хвалынская	5	5500-5000 л.л.		Microtus ex gr. arvalis
			среднепоздняя	4			Apodemus flavicollis, Sciuridae gen., Muridae gen.
АТЛАНТИЧЕСКИЙ	ранний	маринполь-ская	3	6500-5500 л.л.	Microtus ex gr. arvalis	Сосновые бора+береза, пойменный лес из вяза, липы, лещины, злаковое разнотравье (мезофитный покров)	
		2					
		неолит	ракушечни-ярская	1	9470+300 л.л.		
			поздний мезолит				
Раздорское-2				10000 л.л.			

Данные по мелким млекопитающим были сопоставлены с результатами споро-пыльцевого анализа и данными по моллюскам.

В культурных слоях 2 и 3 (ранний энеолит) обнаружены остатки обыкновенной полевки *Microtus ex gr. arvalis*; в слоях 4 и 5 (развитой энеолит) - найдены *M. ex gr. arvalis*, желтогорлая мышь *Apodemus flavicollis*, *Sciuridae gen.*, *Muridae gen.*; в слое 7 - (поздний энеолит) несколько лет назад был найден бобр - *Castor fiber*; в слое 8 (ранняя бронза) - *M. ex gr. arvalis*, *Muridae gen.* (мелкая форма); в слое 9 (средняя бронза) - *M. ex gr. arvalis*, степная пеструшка *Lagurus sp.*; в слоях 10-12 (поздняя бронза) - *Muridae gen.* (мелкая форма), слепыш *Spalax microphthalmus*. В слое 14 (средневековые) остатки мелких млекопитающих наиболее многочисленны и представлены *M. ex gr. arvalis*, водяная полевка *Arvicola terrestris*; суслик *Spermophilus sp.*, обыкновенный хомяк *Cricetus cricetus*, мышовка *Sicista sp.*; интересна находка синантропного вида - домовой мыши (*Mus musculus*). В слое 14, в отличие от более ранних слоев, обычны остатки водяной полевки. Обилие остатков этого вида отмечается и в материалах из средневековых захоронений о-ва Перечного, расположенного напротив стоянки Раздорское-1. Из могильника на этом острове собраны остатки следующих видов грызунов: *A. terrestris*, *Microtus sp.*, *Spalax microphthalmus*.

Наблюдаемое изменение состава фоновых видов грызунов согласуется с заключениями палеонтологического анализа об изменении климата на этой территории в течение голоцена (Кременецкий, 1987). Так наличие остатков *Apodemus flavicollis*, *Sciuridae gen.*, *Castor fiber* указывает на наличие в энеолите обширных пойменных лесов. *Lagurus sp.* подтверждает распространение ксерофитных злаковых степей в ранней и средней бронзе.

Можно предположить, что множество костей *Arvicola terrestris* в средневековом слое свидетельствует о том, что в районе данного поселения в этот период было не главное русло Дона, как сейчас, а рукав реки со слабым течением и сильно заросшими берегами. Нельзя исключить, что увеличение количества остатков водяной полевки связано с тем, что вид являлся объектом пушного промысла. Остатки слепыша в

захоронении острова Поречный могут свидетельствовать о совсем недавнем отделении острова от коренного правого берега.

Литература

Кияшко В. Я. 1994. Между камнем и бронзой (Нижнее Подонье в V-III тысячелетиях до н. э.) // Донские древности. Вып. 3. Азов.

Кременецкий К. В. 1987. Природные условия неолитических поселений Причерноморья. Автореф. дисс. М.